



Rx-Thuốc bán theo đơn

Tên thuốc: RITSU

"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng"

"Để xa tầm tay trẻ em"

"Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ"

"Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

PHẦN THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH

Thành phần, hàm lượng của thuốc:

Mỗi ống uống chứa:

Levocarnitin 1000 mg

Tá dược: Acid malic, sucralose, methylparaben, propylparaben, hương tutti frutti, nước tinh khiết.

Mô tả sản phẩm: Dạng bào chế: Dung dịch uống

Quy cách đóng gói:

Hộp x 20 ống x 10 mL/ống

Thuốc dùng cho bệnh gì?

Chỉ định trong các trường hợp thiếu hụt carnitin nguyên phát và thứ phát ở người lớn và trẻ em trên 12 tuổi.

Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?

Người lớn và trẻ em:

Cần theo dõi nồng độ carnitin dạng tự do và dạng liên kết với acyl trong máu và nước tiểu của bệnh nhân trong quá trình điều trị.

Với các bệnh nhân bị rối loạn chuyển hoá bẩm sinh:

Liều dùng phụ thuộc vào tình trạng rối loạn chuyển hoá của từng bệnh nhân và các biểu hiện trên lâm sàng, tuy nhiên có thể theo các hướng dẫn chung như sau:

Liều 200 mg/kg/ngày, chia thành 2 – 4 lần/ngày được khuyến cáo cho các trường hợp bệnh mạn tính. Trong trường hợp các biểu hiện trên lâm sàng không được cải thiện thì có thể tăng lên mức liều cao hơn trong thời gian ngắn. Liều 400 mg/kg/ngày có thể là cần thiết trong các trường hợp rối loạn chuyển hoá mất bù cấp tính, hoặc bệnh nhân có thể chuyển sang dạng tiềm tĩnh mạch.

Với bệnh nhân thẩm phân máu - điều trị duy trì:

Nếu bệnh nhân đã được tiêm tĩnh mạch levocarnitin và đạt hiệu quả trong điều trị khởi đầu, liều duy trì có thể là 1 g/ngày dưới dạng uống. Vào ngày có thẩm phân máu, sử dụng thuốc vào cuối buổi.

Thuốc dùng đường uống. Có thể uống trực tiếp hoặc pha loãng trong nước lọc/nước hoa quả.

Khi nào không nên dùng thuốc này?

Dị ứng với carnitin hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc.

Tác dụng không mong muốn

- Thường gặp, 1/10 > ADR > 1/100

Tim mạch: Áp huyết cao.

Tiêu hóa: Đau bụng, co thắt dạ dày, tiêu chảy

Thần kinh: Đau đầu, buồn nôn và nôn

- Ít gặp, 1/1000 < ADR < 1/100

Tim mạch: Nhịp tim nhanh

Toàn thân: Sốt, mệt mỏi, mui cơ thể, sưng bàn tay, chân dưới và bàn chân, cảm giác ngứa ran

Tiêu hóa: Khó chịu ở bụng, giảm vị giác và cân nặng

Thần kinh: Trầm cảm, chóng mặt,

Mắt: Giảm thị lực

- Hiếm gặp, ADR < 1/1000

Động kinh

Hướng dẫn cách xử trí ADR



Thông báo cho bác sĩ/dược sĩ trong những trường hợp gặp tác dụng không mong muốn.
Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?

Thuốc chống đông máu (như warfarin).

Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc

Không dùng liều gấp đôi để bù vào liều bị quên. Dùng liều tiếp theo như bình thường.

Cần bảo quản thuốc này như thế nào

Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:

Không có dữ liệu.

Cần làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo?

Trong trường hợp sử dụng quá liều thuốc, cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc đến cơ sở y tế gần nhất.

Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này?

Bệnh nhân mắc bệnh về thận hoặc suy thận hoặc bệnh nhân đang thẩm phân máu.

Bệnh nhân đái tháo đường và đang sử dụng insulin hoặc bất kỳ loại thuốc nào để điều trị đái tháo đường.

Bệnh nhân đang sử dụng thuốc chống đông máu (như wafarin).

Sản phẩm có chứa propylparaben và methylparaben, do đó cần chú ý phản ứng dị ứng có thể gặp phải khi sử dụng sản phẩm này.

Phụ nữ có thai và cho con bú: hỏi ý kiến của bác sĩ trong trường hợp đang mang thai hoặc chuẩn bị mang thai, hoặc đang cho con bú.

Người lái xe hoặc vận hành máy móc: thuốc không có ảnh hưởng tới người lái xe hoặc người đang vận hành máy móc.

Khi nào cần tham vấn bác sĩ, dược sĩ?

"Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ"

Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất .

Tên, địa chỉ, biểu tượng (nếu có) của cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ME DI SUN.

Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Ngày xem xét sửa đổi cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: _____

