

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

PROBIO[®]

GMP WHO

THUỐC BỘT

THÀNH PHẦN:

Mỗi gói chứa:

Bột đông khô chứa 1 tỷ (10^9) vi sinh sống *Lactobacillus acidophilus*.

Tá dược: Maltodextrin.

DẠNG TRÌNH BÀY:

Hộp 14 gói x 1 gam.

DƯỢC LỰC:

Trong ruột người có nhiều vi khuẩn thuộc nhiều loại tạo thành quần thể gọi là tạp khuẩn ruột. Trong tạp khuẩn, ngoài vi khuẩn gây bệnh còn có các vi khuẩn có ích tạo nên sự cân bằng cho hệ vi sinh đường ruột. Nếu vì lý do nào đó: rượu, stress, nhiễm trùng, sử dụng kháng sinh hay hoá trị liệu làm cho sự cân bằng trong hệ tạp khuẩn ruột bị phá vỡ, đồng thời có sự tăng sinh quá mức các vi khuẩn gây bệnh sẽ đưa đến các rối loạn như: tiêu chảy, khó tiêu, trướng bụng ...

Probio với *Lactobacillus acidophilus* - một thành phần thường trực của nhóm vi khuẩn có ích - sẽ giúp ngăn ngừa và điều trị các rối loạn trên để tạo thể cân bằng cho hệ vi khuẩn đường ruột.

CHỈ ĐỊNH:

Probio được chỉ định trong các trường hợp:

- Bổ sung vi khuẩn có ích ở ruột: Giúp tiêu hoá thức ăn, hỗ trợ tiêu hoá Lactose (có nhiều trong sữa).
- Cân bằng hệ vi sinh đường ruột bị phá vỡ do: rượu, stress, nhiễm trùng, sử dụng kháng sinh hoặc các thuốc hoá trị liệu.
- Sự lên men bất thường ở ruột, rối loạn tiêu hoá.
- Viêm ruột cấp tính hay mãn tính: tiêu chảy, táo bón. **TR0006-5**

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

Người lớn và trẻ em: 1 - 2 gói mỗi ngày, pha trong một ít nước để uống, tốt nhất nên uống lúc bụng đói hoặc trước bữa ăn.

Nhũ nhi: 1/2 - 1 gói mỗi ngày, pha trong sữa, nước súp hoặc nước đường.

THẬN TRỌNG:

Thuốc này ở dạng bổ sung vi khuẩn nên không có lưu ý và cảnh báo đặc biệt.

Phụ nữ có thai và cho con bú: chưa có tài liệu nghiên cứu về sự ảnh hưởng của thuốc với các đối tượng này.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Không nên uống chung với Tetracyclin vì Lactobacillus acidophilus có thể ngăn cản sự hấp thu Tetracyclin.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Chưa có báo cáo về việc sử dụng quá liều.

ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM.

NẾU CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN: dưới 30°C, tránh ẩm và ánh sáng.

TR0006-5



IMEXPHARM

Sản xuất tại: **CÔNG TY CPDP IMEXPHARM**

Số 4, Đường 30/4, P. 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Hotline: 1800.555.535 E-mail: imp@imexpharm.com