

BO Y TE  
CUC QUAN LY DUOC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 23/...3.../2016

VD - 24068 - 16 / 153

NỘI DUNG MẪU HỘP HOÀN LỤC VỊ ĐỊA HOÀNG-HỘP 1 VÍ X 10 HOÀN



Kích thước 71mm x 172mm

Tỷ lệ: 80%

Số lô SX: HD:



CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO  
Tầng 4, 9691724 - 021 3791019 - Fax: 021 3981739  
Tư vấn khách hàng: 18006612



Traphaco®  
*Hoàn*  
**LỤC VỊ ĐỊA HOÀNG**



Hộp 1 vỉ x 10 hoàn mềm

**LỤC VỊ ĐỊA HOÀNG**

**CÔNG DỤNG:**  
Tư âm bổ thận, Dùng trong trường hợp thận âm suy tổn, thần hình gầy yếu, chóng mặt u tai, lưng gối mềm yếu, cột sống, di tinh, mồ hôi trộm, người khó hào.

**THÀNH PHẦN:**  
Thục địa..... 1,15g    Phụ linh..... 0,71g  
Hoài sơn..... 0,96g    Trạch tả..... 0,71g  
Sơn thù..... 0,96g    Tà dược(Mật ong)..  
Màu đơn bì..... 0,71g    Vd..... 1 viên

Hộp 1 vỉ x 10 hoàn mềm



**LIÊU DÙNG, CÁCH DÙNG:** Ngày dùng 2 lần, mỗi lần một viên hoàn.  
**CHÔNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG, THÔNG TIN KHÁC:** Xin xem toa hướng dẫn sử dụng trong hộp thuốc.  
**TÊU CHUẨN:** TCCS  
**BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không qua 30°C, tránh ánh sáng.

ĐỂ NGOÀI TÂM TAY TRẺ EM  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



SĐK:  
Số lô SX:  
Ngày SX:  
HD:



## Toa hướng dẫn sử dụng thuốc

### Hoàn LỤC VỊ ĐỊA HOÀNG



**Trình bày:** Hộp 10 viên hoàn mềm x 10 gam

**Công thức cho 1 viên hoàn:**

Thục địa ( <i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i> )	1,15 g
Hoài sơn ( <i>Tuber Dioscoreae persimilis</i> )	0,96 g
Sơn thù ( <i>Fructus Corni officinalis</i> )	0,96 g
Mẫu đơn bì ( <i>Cortex Paeoniae Suffruticosae</i> )	0,71 g
Phục linh ( <i>Poria</i> )	0,71 g
Trạch tả ( <i>Rhizoma Alismatis</i> )	0,71 g
Tá dược (mật ong) ....vd....	1 viên

**\* Chỉ định điều trị :**

Tư âm bổ thận. Dùng trong trường hợp thận âm suy tổn, thân hình gầy yếu, chóng mặt ù tai, lưng gối mềm yếu, cốt chùng, di tinh, mồ hôi trộm, người khô háo.

**\* Liều dùng – cách dùng :** Ngày dùng 2 lần, mỗi lần 1 hoàn

**\* Sử dụng quá liều:** Tuy thuốc không độc, nhưng không được sử dụng quá liều chỉ định.

**\* Chống chỉ định:** Người thể hàn, tỳ vị hư hàn

Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

**\* Tác dụng phụ:** Chưa có báo cáo nào về tác dụng phụ của thuốc gây nên

Nếu có bất thường khi dùng thuốc cần ngừng ngay và báo cho dược sỹ hoặc bác sỹ biết để xử lý

**\* Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc :** Có thể dùng được thuốc khi đang lái xe và vận hành máy móc.

**\* Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác :** Chưa phát hiện tương tác của thuốc với các thuốc khác.

**\* Thận trọng:** Không nên dùng trong các trường hợp sau:

- Ăn không tiêu
- Đại tiện lỏng do hư hàn
- Cảm sốt
- Phụ nữ có thai
- Người đái tháo đường

**\* Bảo quản:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng

**\* Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**\* Tiêu chuẩn:** TCCS



TRƯỞNG  
P. TRƯỞNG PHÒNG  
Đỗ Minh Hùng

### ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG  
NẾU CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC**

### Cơ sở sản xuất:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO**

Tân Quang- Văn Lâm- Hưng Yên

Tel: 0321.3791016 - FAX: 0321.3991790